

SUDDEN UNEXPECTED INFANT DEATH (SUID) RISK FACTORS

Sudden Unexpected Infant Death (SUID) is the leading cause of death for babies between one month and one year of age.



Babies are at greater risk of dying from SUID if they are exposed to nicotine or tobacco before or after birth or if they are not up-to-date on their immunizations.

A baby's risk also increases when placed to sleep

- On the stomach or the side.
- In the crib with blankets, pillows, toys, or crib bumpers.
- In the same bed as another person.
- On soft surfaces such as adult mattresses, sofas, or water beds.
- In seats or beds that do not meet current cpsc.gov standards for safe infant sleep.
- Wearing hats or layers that may overheat the baby.
- Near dangling items, such as pacifier attachments, cords from window blinds, or mobiles.

Make sure everyone who cares for your baby avoids these risk factors all the time.

MUERTE INFANTIL SÚBITA E INESPERADA (SUID) FACTORES DE RIESGO

La Muerte Infantil Súbita e Inesperada (SUID) es la primera causa de muerte entre los bebés de un mes a un año de vida.

Los bebés están más propensos a morir de SUID cuando el bebé es expuesto

a tabaco o nicotina antes o después del parto o cuando el bebé no está al día con las vacunas.

El riesgo de una bebé incrementa cuando el bebé:

- Se pone a dormir boca abajo o de lado.
- Se pone a dormir en la cuna con frisas (cobijas o mantas), almohadas o juguetes blandos.
- Se pone a dormir en la cama con otra persona.
- Se pone a dormir en superficies suaves como el colchón de un adulto, sofás o camas de agua.
- En sillas o camas que no cumplan con los estándares de cpsc.org sobre la seguridad de los niños a lo hora de dormir.
- Tiene muchos gorros o muchas capas de ropa que haga que el bebé se sobrecaliente.
- Duerme cerca de objetos colgantes como chupetes (chupos) atados al cuerpo, lazos de cortina en ventanas o juguetes móviles.

Asegúrese que la persona al cuidado de su bebé evite todos estos riesgos en todo momento.

